






HEPARINES NON FRACTIONNEES AUX HUG: Administration chez l'adulte

Produits disponibles:

Présentation		Conditionnement et concentration	Indication aux HUG	Code article
Héparines destinées à l'administration IV ou SC chez l'adulte aux HUG				
Héparine sodique Bichsel® 20'000 UI / 48 mL <i>NB : Héparine dite « concentrée »</i>		flacon ; 416 UI/mL	IV continu sur 24h	142721
Héparine sodique Bichsel® 5'000 UI / 1 mL		ampoule ; 5'000 UI/mL	IV bolus	406148
Calciparine® Héparine calcique 5'000 UI / 0.2 mL		seringue prête à l'emploi ; 25'000 UI/mL	SC	418904
Autres spécialités disponibles aux HUG				
Héparine sodique Sintetica® 500 UI / 5 mL		ampoule ; 100 UI/mL	IV, SC	114990
Héparine sodique Bichsel® 50 UI / 1 mL		ampoule ; 50 UI/mL	IV, SC	6923

NB : Selon la concentration utilisée, l'héparine peut être responsable d'incompatibilités lorsqu'elle est administrée en Y avec d'autres médicaments par voie IV. Pour toute question, veuillez contacter l'Assistance pharmaceutique au 31080.

Préparation et administration IV de l'héparine sodique chez l'adulte:

Héparine concentrée à 420 UI/mL (20 000 UI / 48 mL)	
Administration en pousse-seringue (PSE)	
<p>→ Héparine sodique: 20'000 UI = 48 mL</p> <p>→ Prélever le contenu total à l'aide d'une seringue de 50 mL (vol. total = 48 mL)</p> <p>→ 1 mL = 420 UI ; 1 UI = 0.0024 mL</p>	
Dose (UI / 24h)	Débit (mL/h)
5'000	0.5
10'000	1.0
15'000	1.5
20'000	2.0
25'000	2.5
30'000	3.0
35'000	3.5
40'000	4.0
45'000	4.5
50'000	5.0
55'000	5.5
60'000	6.0

Valeurs
arrondies!

Voir également les documents suivants :

- [Compatibilité des médicaments injectables administrés en Y](#)
- [Héparines non fractionnées aux HUG : Prescription chez l'adulte](#)
- [Harmonisation de l'utilisation des héparines non fractionnées aux HUG](#) Comed-Info No 3;2008

Pour plus d'informations: Service d'angiologie et d'hémostase (No tél. 33 339)