


Mode d'emploi Vaccin Jynneos (variole du singe, monkeypox)




Produit

Jynneos® vaccin monkeypox fiole 0.5 mL (pce) code 494882

Le vaccin Jynneos® est un vaccin de troisième génération produit par la firme Bavarian Nordic. Une fiole contient 0.5 mL de suspension injectable (suspension laiteuse de couleur blanche à jaune pâle) à administrer par voie sous-cutanée à intervalle d'au moins 4 semaines entre les deux doses.

Livré à la pièce en chaîne du froid dans une boîte en carton avec séparation interne ou dans boîte originale de 20 pièces.

→ Date expiration indiquée sur étiquette



Généralités

- Fiole pour 1 dose sous-cutanée (0.5 mL) prête à l'emploi.
- **1 dose de vaccin sous-cutané = 0.5 mL (flacon entier)**
- Schéma de vaccination : 2 doses de 0.5 mL à au moins 4 semaines d'intervalle
- Voie d'administration : voie SC

Modalités de conservation et stockage

Fiole non ouverte : conservation **au frigo entre 2 et 8°C (à l'abri de la lumière)** jusqu'à date d'expiration.
Les fioles non ouvertes se conservent pendant **6 heures à température ambiante (< 25°C)**.

Préparation et administration des seringues

Le vaccin Jynneos® se présente sous la forme d'une fiole mono-dose (0.5 mL) prête-à-l'emploi. Il s'administre par voie sous-cutanée.

Travailler en respectant les mesures d'hygiène institutionnelles (règles d'asepsie) pour la préparation et l'administration des médicaments injectables (<https://vigigerme.hug.ch/>).

Respecter les procédures médico-soignantes pour l'administration sous-cutanée (<https://www.hug.ch/procedures-de-soins/les-injections-chez-ladulte>).

Les mains sont soigneusement désinfectées à chaque étape, le port des gants n'est pas requis à moins d'avoir une plaie sur la main.

1. Sortir la fiole du réfrigérateur 10 min avant l'administration, vérifier la date d'expiration.
2. Tenir le flacon en position verticale et remuer doucement la fiole durant 30 secondes en lui faisant faire des petits cercles pour homogénéiser la suspension.
3. Prélever l'entièreté de la suspension à l'aide d'une aiguille de prélèvement et d'une seringue à 1 mL.
4. Désolidariser la seringue de l'aiguille de prélèvement et y fixer une aiguille pour administration sous-cutanée.
5. Injecter la dose (0.5 mL) de suite (= dans les 30 min) par voie sous-cutanée. Il n'y a pas de données de stabilité du vaccin dans une seringue.
Si une seringue n'est pas utilisée immédiatement (max 30 min), elle doit être préalablement étiquetée.
6. Eliminer les restes de la fiole et le matériel usagé dans une poubelle à médicaments.

Lot : Jynneos 0.5mL SCut
Date Vaccin variole du singe
A utiliser de suite



Remarque

Pour toute question concernant la préparation et l'administration du vaccin Jynneos®, consulter le Centre d'Information Pharmaceutique (079 55 31080) des HUG.

Pour toute question concernant les livraisons cantonales, contacter Mme B. Burtin (079 55 31076).

Références :

- Infos OFSP sur la vaccination de la variole du singe :
<https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/affenpocken/informationen-fuer-gesundheitsfachpersonen/impfung-und-impfstoff.html>
- SOP Préparation et administration intradermique et sous-cutanée du vaccin Jynneos® contre la variole du singe <https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/infektionskrankheiten/Affenpocken/sop-affenpocken-impfung.pdf.download.pdf/SOP%20Vaccin%20contre%20la%20variole%20du%20singe.pdf>