


GUIDE DU PRESCRIPTEUR POUR LES PRODUITS à FABRIQUER

Indications

La pharmacie des HUG fabrique au besoin des préparations magistrales pour les patients hospitalisés aux HUG. Le médecin en charge du patient peut prescrire une préparation magistrale par l'intermédiaire de Presco en suivant la procédure présentée ci-dessous.

Comment saisir une prescription?

1. Choisir l'onglet « P » (prescription) dans Presco
2. Sélectionner : « Pharmacie » dans le menu à gauche
3. Sélectionner selon la fabrication à faire :
 - a. « Préparation magistrale pour capsules ou poudre en sachet »
 - b. « Préparation magistrale pour pommade ou crème »
 - c. « Préparation magistrale de poudre en vrac ou solution »
4. L'interface de saisie de la prescription d'ordonnance destinée à la Pharmacie s'ouvre





5. Remplir tous les champs nécessaires (lieu de livraison, composition, traitement, ...)
6. Valider la prescription
7. Signer l'ordre - La prescription est transmise à la pharmacie !
8. Prescrire l'ordre pour les infirmières (nom du produit, dosage, posologie, ...)

Prescription de produits courants

Certains produits couramment prescrit en préparation magistrale ont un écran de prescription préenregistré (PRESET).

9. Au point 3 présenté précédemment, sélectionner « Préparation magistrale de poudre en vrac ou solution »
10. Cliquer sur le menu déroulant pour afficher toutes les préparations préenregistrées (PRESET)





- Gargarisme dans les mucites (réservé MED-A1)
- Hydromorphone HCl 1000 mg cassette CADD
- Levosimendan (SIMDAX) 2 seringues de 6.25 mg = 2.5mL
- Morphine sulfate 1000 mg cassette CADD
- Morphine sulfate 2000 mg cassette CADD
- OPH: Collyre Fluconazole 0.2% 2 mL
- OPH: Collyre Oxybuprocaine 0.1% 1 mL
- OPH: Collyre Vancomycine 33 mg/mL 1 mL
- OPH: Collyre Voriconazole 1% 1 mL
- OPH: Collyre Voriconazole 1% 3 mL
- OPH: Mytomyicine 0.1% sous conjonctivale Seringue 1 mL
- OPH: Serum autologue collyre 20%
- Solution pour aérosol (calcium, dexphenthéol, méthylprednisolone) 52 mL
- Triamcinolone acetonide 4mg/0.1ml%
- Triptoreline acetate 0.1 mg/mL
- valACYclovir (VALTRES) susp. orale 50 mg/mL
- valGANciclovir (VALCYTE) susp. orale 50 mg/mL
- Verrou vancomycine pour DAVI 2ml 10mg 5mg/ml

11. Sélectionner la préparation adaptée dans la liste
12. Cliquer sur modifier pour afficher les informations préenregistrées
13. Remplir les champs nécessaires (date du traitement, fréquence, etc)
14. Valider la prescription
15. Signer l'ordre - La préparation est transmise à la pharmacie !
16. Prescrire l'ordre pour les infirmières (nom du produit, dosage, posologie,...)

Si vous prescrivez régulièrement une préparation magistrale et que vous aimeriez que la pharmacie crée un PRESET pour celle-ci, merci de contacter le Dre L. Bouchoud au 31084.